

MM

Estudio con Pacientes de Mieloma Múltiple en Colombia

Se estima que en Colombia se diagnostican cada año alrededor de



600 nuevos casos de MM

127



Pacientes fueron vinculados al estudio de investigación

67 Mujeres



60 Hombres

Con edades entre 37 y 84 años

Reciben tratamiento en 8 ciudades del país



• Bogotá
• Medellín

• Cali
• Valledupar

• Barranquilla
• Cartagena

• Ibagué
• Neiva

Afiliación en salud



• 67% Régimen contributivo

• 24% Régimen subsidiado

• 8% Régimen especial

• 1% Vinculado

Barreras de acceso al diagnóstico y tratamiento

55%

de los pacientes del régimen subsidiado reporto haber tenido por lo menos una barrera de acceso al sistema de salud

49%

del régimen contributivo

90%

del régimen especial



Tiempo que toma el paciente para consultar al médico

3 meses

4 a 6

+ 7



73% de los pacientes consultó al md en máximo 3 meses

15% tardó de 4 a 6 meses

12% más de 7 meses



86

Pacientes (68%)

recibió diagnósticos erróneos

lo que sugiere un alto desconocimiento de la patología y la dificultad para diagnosticarla.

Hematología



46% de los pacientes fue remitido a Hematología en un tiempo máximo de 1 mes

24% entre 2 y 4 meses

24% entre 5 meses y 1 año

6% más de 1 año

Diagnóstico



• 32% de los pacientes recibió el diagnóstico de MM en máximo 1 mes

• 28% tardó entre 2 y 4 meses

• 25% entre 5 y 11 meses en recibir el diagnóstico correcto

• 15% tardó más de 1 año



Esto confirma la falta de oportunidad en diagnóstico para este tipo de cáncer.

Tratamiento oportuno



• 73% de los pacientes inició tratamiento con oportunidad, es decir, en máximo 2 semanas

• 23% inició entre 3 semanas a 5 meses

• 4% tardó más de 5 meses.



El **50%** de los pacientes

No conoce sobre los protocolos o medicamentos que recibe

El **21%** de los pacientes

Recurrió a un **Derecho de petición**



El **35%**

a una **acción de tutela**

para reclamar sus derechos en salud



Aspectos emocionales



El **39%** reporto sentimientos de tristeza

reporto sentimientos de tristeza

El **26%** angustia y ansiedad

angustia y ansiedad



La mayoría de pacientes reportó cambios en su vida a raíz de la enfermedad:



Hábitos alimenticios

69%



Actividad física

85%




Vida laboral

56%



Solo el **16%** de los pacientes refiere estar activo laboralmente

El **17%** se dedica a oficios del hogar



El **67%** se encuentra inactivo por diversas razones

Cuidadores



El **43%** de los cuidadores presenta fatiga y agotamiento



El **27%** dificultad para dormir y dolor físico



El **21%** manifestó necesitar tiempo para sí mismo